

nutriPHARM® **HEMERIN®**

KREMA ZA
REKTALNU PRIMJENU



MEDICINSKI PROIZVOD

POMOĆ PRI LIJEČENJU HEMOROIDALNIH TEGOBA TE UBLAŽAVANJE
SIMPTOMA SVRBEŽI I PEČENJA.

Tuba 50 ml e s aplikatorom

NUTRIPHARM® HEMERIN® krema je medicinski proizvod za pomoć pri liječenju hemoroidalnih tegoba te ublažavanje simptoma svrbeži i pečenja. Djelovanje NUTRIPHARM® HEMERIN® kreme postiže se pomoći **PROCTOREsolv™** kompleksa (biljni kompleks koji sadrži polifenole listova masline odabranih sorti Frantoio, Leccino i Moraiolo, polisaharide aloje visoke molekulске mase i tanine kestena) obogaćenog s **VegetalHYALO™** hijaluronskom kiselinom biljnog podrijetla i biljnim uljima, koji umiruju iritaciju i štite sluznicu. Ulje gospine trave dobiveno je hladnjim presanjem svježih cvjetova gospine trave.

SASTAV

PROCTOREsolv™ (biljni kompleks koji sadrži polisaharide aloje*, polifenole maslinovog ulja*, tanine kestena), VegetalHYALO™ (hijaluronska kiselina biljnog podrijetla), ulje gospine trave i ulje slatkog badema, tetratranatrijev glutamat diacetat, natrijev hidroksimetil glicinat, natrijev hidroksid, tokoferil acetat, glicerol, karbomer, polyglyceril-3 rice branate, voda.

*z organskog uzgoja

DOZIRANJE

Nanelite krema prema potrebi, ako je moguće poslije svake defekacije (nakon pažljivog i nježnog pranja). Krema se može nanijeti i prije pražnjenja crijeva kako bi se spriječila iritacija izazvana trenjem. U tom slučaju, kremu je potrebno nanijeti i nakon pražnjenja crijeva. Krema se može koristiti sa i bez aplikatora. Može se koristiti više puta dnevno, duži vremenski period.

Krema
ne sadrži PEG,
PARABENE,
FENOKSIETANOL,
EDTA, SLS, SLES



NAČIN PRIMJENE

Za vanjsku primjenu, nanesite i nježno umasirajte kremu na analno i perianalno područje. Za unutarnju primjenu koristite odgovarajući aplikator i slijedite niže navedene upute.

1. Probušite tubu uz pomoć čepa.
2. Skinite čep s tube.
3. Istisnite malu količinu kreme na priloženi aplikator kako biste ga podmazali.
4. Prčvrstite rektalni aplikator na tubu.
5. Umetnute aplikator u rektum, pritisnite tubu sve dok ne utisnete dovoljnu količinu kreme.
6. Nakon upotrebe operite aplikator vrućom vodom i sapunom i zatvorite ga poklopcom.

NAČIN ČUVANJA

Pakiranje čuvati dobro zatvoreno, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i izvora topline. Ne koristiti proizvod ukoliko pakiranje nije cjevovito. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na originalno zatvoren i pravilno čuvan proizvod.

UPozorenja

Proizvod je za rektalnu primjenu. Ne gutati. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti i nepodnošenja bilo kojeg sastojka proizvoda. Iako testiranja proizvoda nisu pokazala učinak senzibilizacije, u slučaju njene pojave preporučuje se prekinuti terapiju i posavjetovati se s liječnikom. Čuvati izvan dohvata djece. Ne koristiti u slučaju oštećene sluznice. Za primjenu u trudnoći i u slučaju istovremene primjene farmakološke terapije, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Proizvod nije namijenjen za primjenu u djece.

NUSPOJAVE

Nema poznatih ili očekivanih neželjenih učinaka povezanih s korištenjem proizvoda. Testiranje proizvoda do danas nije pokazalo učinak senzibilizacije ni druge neželjene učinke. U slučaju pojave dugotrajne iritacije posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

PAKIRANJE

Tuba 50 ml s aplikatorom.

Datum posljednje revizije: svibanj 2017.

Fitopreparatori
Italiani

Biodue S.p.A.
Via A. Lorenzetti, 3/A - Loc. Sambuca V.P.
Tavamelle V.P. (FI)



Distributer: Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Hrvatska