



DiaBlock®

1. Identifikacija, sastav i namjena medicinskog proizvoda

1.1 Opis i upute za upotrebu

Nutripharm® DiaBlock® je medicinski proizvod za jednokratnu upotrebu u obliku praška za oralnu suspenziju, koja se priprema neposredno prije primjene, a namijenjen je za oralno liječenje akutnog i kroničnog proljeva te bolova povezanih s poremećajima probavnog sustava.

1.2 Mehanizam djelovanja

Diosmektit je prirodna glina karakterizirana kristalnom strukturom finih slojeva koji joj daju veliku moć upijanja. To mu omogućuje vezanje tekućina u lumen crijeva, povećavajući tako konzistenciju stolice i usporavajući pražnjenje.

Moć upijanja diosmektita također omogućuje interakciju Nutripharm® DiaBlocka® s glikoproteinima na stijenci sluznice želuca i dvanaesnika, mijenjajući njihove fizičke karakteristike kako bi se formirao zaštitni gel protiv pojačanog lučenja kiseline i tvari štetnih za probavni sustav.

2. Sastav

Jedna Nutripharm® DiaBlock® vrećica sadrži:

Diosmektit 3 g

Pomoćne tvari: aroma naranče, limunska kiselina, silicijev dioksid, acesulfam K, sukraloza.

3. Pakiranje

Kutija sadrži 10 vrećica za jednokratnu upotrebu po 3,25 g.

4. Uputa za upotrebu

Odrasli: 1 vrećica 3 puta dnevno.

Djeca od 6 do 18 godina: 1 vrećica 2-3 puta dnevno.

Djeca od 2 do 6 godina: 1 vrećica 1-2 puta dnevno.

Prije upotrebe proizvoda u djece, preporučuje se posavjetovati se s liječnikom.

Svaka vrećica se nakon otvaranja smije upotrijebiti samo jednom.

Sadržaj vrećice otopite u čaši vode ili druge tekućine.

Za malu djecu, sadržaj vrećice može se pomiješati u bočici za hranjenje s 50 ml vode ili drugog napitka i podijeliti u 2-3 doze tijekom dana. Također, Nutripharm® DiaBlock® može se otopiti i u polukrutaj hrani. Kako biste dobili homogenu suspenziju, potrebno je prah polako dodavati u tekućinu i dobro promiješati.

Nutripharm® DiaBlock® preporučuje se uzimati između obroka.

Kako bi se izbjegla dehidracija, liječenje akutnog i kroničnog proljeva u djece mora biti popraćeno ranom primjenom oralne rehidracijske otopine (ORS).

Kako bi se osigurala odgovarajuća rehidracija u odraslih, preporučuje se, po potrebi, uzimati ORS tijekom liječenja Nutripharm® DiaBlockom®.

5. Poznate nuspojave

Nema poznatih nuspojava povezanih s dugotrajnom upotrebom proizvoda. U slučaju prekoračenja doze mogu se javiti zatvor, bolovi u crijevima i nadutost. U slučaju nuspojava koje nisu ovdje navedene, obratite se liječniku.

6. Upozorenja i mjere opreza

- Čuvajte proizvod izvan dohvata djece.
- Ne koristite Nutripharm® DiaBlock® duže od 10 dana u kontinuitetu. Ako su simptomi i dalje prisutni obratite se liječniku.
- Kod djece, ako proljev potraje dulje od 3 dana, potražite savjet liječnika.

- Ne uzimajte proizvod u ležećem položaju.
- Ne koristite nakon isteka roka valjanosti označenog na kutiji i vrećici.
- Ne koristite ako je pakiranje oštećeno.
- Svaka vrećica je za jednokratnu upotrebu i treba se otvoriti neposredno prije upotrebe: nemojte ponovno koristiti djelomično iskorištene vrećice, jer takav način upotrebe može dovesti do pojave rizika kao što su neučinkovitost otopine ili onečišćenje proizvoda.
- Nemojte prekoračiti preporučenu dozu; u slučaju neželjenih učinaka (zatvor, bolovi u crijevima, nadutost), prekinite upotrebu i obratite se liječniku.
- U slučaju neočekivanih nuspojava, koje nisu navedene, obratite se liječniku.
- Ne koristite u slučaju prisutnih želučanih ili crijevnih lezija ili u slučaju kroničnog zatvora, crijeвне iritacije ili crijevne opstrukcije.
- Medicinski proizvod sadrži aluminij koji dolazi iz diosmektit: ako koristite druge proizvode ili lijekove koji sadrže diosmektit, glinu ili sastojke s aluminijem, obratite se liječniku prije uzimanja Nutripharm® DiaBlock® vrećica.
- Ne uzimajte medicinski proizvod tijekom korištenja drugih proizvoda

ili oralnih lijekova: učinak upijanja diosmektit može negativno utjecati na njihovu učinkovitost. U slučaju istovremene primjene lijekova, prije uzimanja Nutripharm® DiaBlock® vrećica posavjetujte se s liječnikom.

7. Kontraindikacije i ograničenja upotrebe

Ne koristiti proizvod u djece mlađe od 2 godine.

Ne koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na sastojke medicinskog proizvoda.

Ne koristiti proizvod tijekom trudnoće i dojenja.

8. Čuvanje

Nutripharm® DiaBlock® ne smije se koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakiranju.

Čuvati proizvod na sobnoj temperaturi (< 25°C), daleko od izvora svjetlosti, topline i prekomjerne vlage; izbjegavati kontakt s vodom.

Rok valjanosti označen na pakiranju odnosi se na pravilno skladišten proizvod u neotvorenom pakiranju.

9. Odlaganje

Proizvod se mora odlagati u skladu s lokalnim pravilima odlaganja medicinskog otpada. Ni u kom slučaju nemojte odlagati proizvod ili njegovo pakiranje u okoliš.

Datum posljednje revizije: Studeni 2024.



SIIT srl

Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italija

Distributer:

Milsing d.o.o.
Velika cesta 99, 10020 Zagreb
Hrvatska

